

WHOOPIING COUGH (PERTUSSIS) NOTIFICATION LETTER TEMPLATE FOR COLLEGE/UNIVERSITY

Dear Student:

This letter is to inform you that a (*student/teacher/staff member*) at (*college/university*) has been diagnosed with whooping cough.

Whooping cough, also called pertussis, is a very contagious bacterial infection that can spread through close contact when people with the disease cough. Symptoms can appear 5 to 21 days after infection. It usually starts like a common cold (e.g., sneezing, runny nose, etc.) followed by a cough that gets worse over one to two weeks. People with whooping cough may have coughing spells in which they can't catch their breath between coughs. Some may loudly gasp ("whoop") and vomit or feel like they're choking. There is usually no fever with whooping cough.

In general, whooping cough vaccines are very effective in either preventing disease or decreasing its severity soon after receiving the vaccine series or booster dose. However, immunity to whooping cough wears off quickly over time, so even people who were fully vaccinated as children can get whooping cough.

A booster dose of vaccine (Tdap) is recommended for everyone 11 years of age and older, especially pregnant women (with each pregnancy) and caregivers of young infants. If you haven't had Tdap, make sure to get it now. The Tdap vaccine is widely available at doctor's offices, [*the student health center, if applicable*], some pharmacies, and local health departments and is generally covered by most insurance plans.

If you have cold symptoms and are coughing, please contact your doctor. Tell the doctor that one confirmed case of whooping cough has been reported in your [*college/university*]. The most accurate test for diagnosing whooping cough is collected using a nasal swab. **If you have been seen by a doctor and whooping cough was diagnosed, please stay at home until you've completed 5 days of the prescribed antibiotic treatment.**

The (*health department name*) will continue to investigate the situation. If you or your doctor has any questions, please call (*name of college/university contact*) at (*phone number*) or (*health department name*) at (*phone number*).

Sincerely,

(*Name*), College/University President
(*Name*), (*County*) Health Officer

PLANTILLA DE CARTA DE NOTIFICACIÓN SOBRE TOS FERINA (PERTUSSIS) PARA UNIVERSIDADES

Estimado estudiante:

Esta carta es para informarle que un (*estudiante/maestro/miembro del personal*) de la (*college/university*) fue diagnosticado con tos ferina.

La tos ferina, conocida como pertussis (*whooping cough, en inglés*), es una infección bacteriana muy contagiosa que se puede transmitir al tener contacto cercano cuando personas enfermas tosen. Los síntomas pueden aparecer de 5 a 21 días después de la infección. Generalmente, comienza como un resfriado común (es decir, estornudos, nariz mucosa, etc.) seguido por una tos que empeora en una o dos semanas. Las personas con tos ferina pueden tener ataques de tos en los cuales no pueden respirar entre la tos. Algunos pueden producir un fuerte silbido al toser y vomitar o sentir que se están asfixiando. Por lo general, la tos ferina no produce fiebre.

En general, las vacunas contra la tos ferina son muy efectivas para prevenir la enfermedad o disminuir su gravedad pronto después de recibir la serie de vacunas o la dosis de refuerzo. Sin embargo, la inmunidad contra la tos ferina se desvanece rápidamente con el tiempo, por lo que incluso personas que se vacunaron como niños pueden contagiarse de tos ferina.

Se recomienda una dosis de refuerzo de una vacuna (Tdap) a todos los mayores de 11 años, especialmente las mujeres embarazadas (con cada embarazo) y cuidadores de niños pequeños. Si no recibió la vacuna Tdap, asegúrese de ponérsela ahora. La vacuna Tdap está ampliamente disponible en los consultorios médicos [*the student health center, if applicable*], algunas farmacias, departamentos de salud locales, y generalmente, la cubre la mayoría de los planes de seguro.

Si tuvo síntomas de resfriado y está tosiendo, comuníquese con el doctor. Dígale al doctor que se reportó un caso confirmado de tos ferina en su [*college/university*]. La prueba más precisa para diagnosticar la tos ferina se reúne mediante una muestra nasal. **Si fue a visitar al doctor y le diagnosticó tos ferina, quédese en su casa hasta que haya completado los 5 días de tratamiento de antibiótico recetado.**

El (*health department name*) continuará investigando la situación. Si usted o su doctor tienen alguna pregunta, llame a (*name of college/university contact*) al (*phone number*) o (*health department name*) al (*phone number*).

Atentamente,

(*Name*), Presidente de la Universidad
(*Name*), (*County*) Oficial de Salud