


**វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្ត សម្រាប់ការពិនិត្យតាមដានរោគសញ្ញានិង
ការប៉ះពាល់និងមេរោគ នៅមណ្ឌលថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច
គ្រឹះស្ថានអប់រំ និងសាលារៀន TK-12**

*នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 9/20/2021*

វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់ *កុមារ* ដែលមានរោគសញ្ញា

វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់កុមារដែលមានរោគសញ្ញាមុនចូល¹ទៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់ថ្នាំបង្ការ


¹ប្រសិនបើកុមារមិនស្រួលខ្លួននៅឯទីតាំងនោះ សូមដាក់កុមារឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក (ឆ្ងាយពីអ្នកអ្នកមើលថែ យកល្អដាក់កុមារទីផ្លូវខាងក្រៅ) ហើយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។



¹រោគសញ្ញានានាដែលទំនងជាស្របទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំពោះកុមាររួមមាន៖ គ្រុនក្តៅលើសឬស្មើ (≥) 100.4°F ក្នុងកំរិតឡើងថ្មី (ខុសគ្នាពីធម្មតាឬទូទៅ) រាករូស ឬក្អកចង្ហោរ។ ប្រសិនបើរោគសញ្ញារបស់កុមារមិនទំនងជាស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ទេ ប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រួយបារម្ភនោះ ត្រូវបានណែនាំឱ្យទទួលការវាយតម្លៃរបស់កុមារពីអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។

វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការ ហើយបានប៉ះពាល់ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយ កុមារ¹ ដែលអាចមានឆ្លងមេរោគ នៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ


1 កុមារដែលអាចមានឆ្លងមេរោគ គឺជាកុមារដែលមានរោគសញ្ញាលើសពីប្តូស្តើ (\geq) 1 ដែលទំនងជាស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19។ **បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារដែលអាចមានឆ្លងមេរោគ** គឺជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ 6 ហ្វីតក្នុងពេលលើសពីប្តូស្តើ (\geq) 15 នាទីក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងជាមួយកុមារដែលអាចឆ្លងមេរោគ ឬប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងវត្តមាន/សារធាតុបញ្ចេញពីរាងកាយផ្សេងៗ ពីកុមារដែលមានឆ្លងមេរោគនេះ។



²ការប៉ះពាល់មេរោគត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារដែលអាចមានឆ្លងមេរោគប្រសិនបើទីតាំងនោះ ទទួលបានដំណឹងថាកុមារដែលអាចមានឆ្លងមេរោគនោះ ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ឬក៏ទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 ពីអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។

វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់បុគ្គលដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ ហើយបានប៉ះពាល់ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយ កុមារ¹ ដែលអាចជាឆ្លងមេរោគ នៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ

¹កុមារដែលអាចមានឆ្លងមេរោគគឺជាកុមារដែលមានរោគសញ្ញាលើសពីបួនស្នើ (≥) 1 ដែលទំនងជាស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19។ បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារដែលអាចមានឆ្លងមេរោគគឺជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ 6 ហ្វីតក្នុងពេលលើសពីបួនស្នើ (≥) 15 នាទីក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងជាមួយកុមារដែលអាចឆ្លងមេរោគ ឬប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងវត្តមាន/សារធាតុបញ្ចេញពីរាងកាយផ្សេងៗ ពីកុមារដែលមានឆ្លងមេរោគនេះ។




²ការប៉ះពាល់មេរោគត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារដែលអាចមានឆ្លងមេរោគ ប្រសិនបើទីតាំងនោះ ទទួលបានដំណឹងថាកុមារដែលអាចមានឆ្លងមេរោគនោះ ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ឬក៏ទទួលបានការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 ពីអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។

វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់ *បុគ្គលិក* ដែលមានឆោតសញ្ញា

វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្ត សម្រាប់បុគ្គលិកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការ ហើយមានរោគសញ្ញាមុនពេលចូល¹ ទៅក្នុង ស្ថាប័នអប់រំ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់ថ្នាំបង្ការ


ប្រសិនបើបុគ្គលិកមិនស្រួលខ្លួននៅកន្លែងការងារ សូមដាក់បុគ្គលិកឱ្យនៅទីតាំងដាច់ដោយឡែក (យកល្អ ដាក់បុគ្គលិកនៅទីធ្លាខាងក្រៅ រកគម្លាតរាងកាយពីអ្នកមើលថែផ្សេងទៀត) ហើយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រ សម្រេចចិត្តដូចខាងក្រោម។



¹រោគសញ្ញានានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ចំពោះមនុស្សពេញវ័យមានដូចជា៖ គ្រុនក្តៅលើសពីបួស្តើ (≥) 100.4° ឬមានអារម្មណ៍ដូចគ្រុនក្តៅ (គ្រុនរងារ បែកញើស) ក្អក ដកដង្ហើមខ្លីៗ លែងដឹងរសជាតិឬក្លិនថ្លើៗ អស់កម្លាំង ហៀរសំបោរឬក៏ងច្រមុះ ឈឺសាច់ដុំឬឈឺរាងកាយ ឈឺក្បាល ឈឺ បំពង់ក ចង្កោរចង់ក្អកឬក្អក ឬរាករូស។ ប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងនេះទេ ប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រួយបារម្ភ បានណែនាំ ឱ្យទទួលការវាយតម្លៃបន្ថែមដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។

វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការ ហើយបានប៉ះពាល់ឬមានទំនាក់ទំនងនឹងមេរោគពី បុគ្គលិក¹ ដែលអាចមានឆ្លងមេរោគនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ


¹បុគ្គលិកដែលអាចមានឆ្លងមេរោគគឺជាបុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញាលើសពីប្លូស្ទី (≥) 1 ដែលទំនងជាស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19។ បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលិកដែលអាចមានឆ្លងមេរោគគឺជាមនុស្សនៅទីតាំងនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ 6 ហ្វីតក្នុងពេលលើសពី 15 នាទីក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងជាមួយបុគ្គលិកដែលអាចឆ្លងមេរោគ ឬប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងវត្តមាន/សារធាតុបញ្ចេញពីរាងកាយផ្សេងៗ ពីបុគ្គលិកដែលមានមេរោគនេះ។



²ការប៉ះពាល់មេរោគត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលិកដែលអាចមានឆ្លងមេរោគ ប្រសិនបើទីតាំងនោះទទួលបានដំណឹងថាបុគ្គលិកដែលអាចមានឆ្លងមេរោគនោះ ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ឬក៏ទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 ពីអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។

វិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តសម្រាប់បុគ្គលដែលបាន**ចាក់ថ្នាំបង្ការពេលលេញ** ហើយបានប៉ះពាល់នឹងមេរោគពី បុគ្គលិក¹ ដែលទំនងមានឆ្លងមេរោគ នៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំ

¹បុគ្គលិកដែលអាចមានឆ្លងមេរោគគឺជាបុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញាលើសពី (≥) 1 ដែលទំនងជាស្របទៅនឹងជំងឺ COVID-19។ បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលិកដែលអាចមានឆ្លងមេរោគគឺជាមនុស្សនៅទីតាំងនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ 6 ហ្វីតក្នុងពេលលើសពី 15 នាទីក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងជាមួយបុគ្គលិកដែលអាចឆ្លងមេរោគ ឬប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងវត្តារ/សារធាតុបញ្ចេញពីរាងកាយផ្សេងៗ ពីបុគ្គលិកដែលមានមេរោគនេះ។



² ការប៉ះពាល់មេរោគត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលិកដែលអាចមានឆ្លងមេរោគ ប្រសិនបើទីតាំងនោះទទួលបានដំណឹងថាបុគ្គលិកដែលអាចមានឆ្លងមេរោគនោះ ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ឬក៏ទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 ពីអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។

**វិធីសាស្ត្រធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់កុមារនិងបុគ្គលិកដែល *មានការប៉ះពាល់នឹងមេរោគ*
នៅមណ្ឌលថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច គ្រឹះស្ថានអប់រំ និងសាលារៀន TK-12**

កំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការប៉ះពាល់នឹងមេរោគនៅក្នុងបរិវេណទីតាំង-បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅនឹងករណី ច្បាស់លាស់មួយ

បុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានប៉ះពាល់ទៅនឹងអ្នកដែលត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលដែលអាចចម្លងបាន* ប្រសិនបើ យ៉ាងហោចណាស់ចំណុចមួយ ក្នុងចំណោមចំណុចខាងក្រោមបានកើតឡើង៖

- បុគ្គលម្នាក់នោះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ 6 ហ្វីតពីមនុស្សដែលមានជំងឺ COVID-19 រយៈពេលសរុប 15 នាទី ឬយូរជាងនេះក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោង

ឬ

- បុគ្គលម្នាក់នោះបានប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុរាវនៃរាងកាយ និងឬសារធាតុបញ្ចេញផ្សេងៗ ពីបុគ្គលដែលមានជំងឺ COVID-19 ដោយមិនមានការការពារ។ ពួកគេត្រូវបានគេក្អកក្អងស្អិតស្អាត ពួកគេបានប្រើពែងឬប្រដាប់ប្រដាប់បរិភោគរួមគ្នា ពួកគេបានថែបក្តា ឬពួកគេបានផ្តល់ការថែទាំដល់អ្នកដែលផ្ទុកមេរោគដោយមិនបានពាក់ឧបករណ៍ការពារត្រឹមត្រូវ។
- បុគ្គលដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា **អាចចម្លងមេរោគបាន** ហើយអាចរាលដាលមេរោគទៅអ្នកដទៃបាន ចាប់ពី 2 ថ្ងៃ មុនពេលមានចាប់ផ្តើមចេញរោគសញ្ញាដំបូង រហូតដល់ពេលបញ្ចប់នៃការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក (ពោលគឺ 10 ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីពេលរោគសញ្ញាបានចាប់ផ្តើម ហើយមិនមានគ្រុនក្តៅយ៉ាងហោចណាស់ 24 ម៉ោង និងរោគសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ស្បើយឡើង) ឬចាប់ពី 2 ថ្ងៃមុនពេលការធ្វើតេស្តទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានរបស់ពួកគេ រហូតដល់ 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តនោះ ប្រសិនបើរោគសញ្ញាមិនដែលកើតឡើង។

កំណត់សម្គាល់៖ បុគ្គលម្នាក់មិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទេ លុះត្រាតែកម្មវិធីនេះដឹងច្បាស់លមថាពួកគេស្របតាមនិយមន័យនៃទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធខាងលើ។ បុគ្គលមិនគួរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ដោយសារតែពួកគេមានវត្តមាននៅក្នុងថ្នាក់ ឬក្រុមសាលារៀនដូចគ្នា ខណៈដែលមានមនុស្សមានជំងឺ COVID-19 ទាំងស្រុងនោះទេ។ ប្រសិនបើកម្មវិធីមិនអាចកំណត់បានថា តើអ្នកណាជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ពួកគេគួរតែទាក់ទងសុខភាពសាធារណៈដើម្បីទទួលបានជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស។

សម្រាប់កុមារដែលបានប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគ*៖ តើការធ្វើចត្តាឡីស័កមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណា?



តាមដានរោគសញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី 14

*អនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនៃការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះរបស់នាយដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles។ ** ការធ្វើចត្តាឡីស័កដែលបានកែសម្រួលអនុវត្តតែចំពោះសិស្សសាលារៀន TK-12 ដែលបានប៉ះពាល់នឹងមេរោគនៅក្នុងទីតាំងសាលារៀនតែប៉ុណ្ណោះ។

12 (Cambodian)

សម្រាប់បុគ្គលិកដែលបានប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគ*៖ តើការធ្វើចត្តាឡីស័កមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណា?



*អនុវត្តតាម សេចក្តីណែនាំនៃការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីស័កដោយមិនមានបញ្ហា ដែលអាចមុនពេលពួកគេបំពេញតាម លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការរបស់ Cal/OSHA 13(Cambodian)