

چرا مهم است که واکسینه شویم؟

واکسن های کووید-19 از افراد در مقابل بیماری شدید ناشی از کووید-19 و رفتن به بیمارستان یا مرگ حفاظت می کنند. آنها همچنین خطر ابتلا به بیماری مزمن ناشی از کووید-19 (مانند کووید طولانی) و غیبت از کار و مدرسه را کاهش می دهند.

بعلاوه، واکسینه شدن خطر انتقال کووید-19 به دیگر افراد را کاهش می دهد. این بویژه برای حفاظت افرادی که در معرض خطر بالاتری برای بیماری شدید قرار دارند، مفید است.

توصیه می شود افرادی که در گذشته به کووید-19 مبتلا بوده اند، هنوز واکسن دریافت کنند تا مصونیت خود را تقویت کرده و خطر بستری شدن خود در بیمارستان را به سبب کووید-19 کاهش دهند.

عملکرد واکسن ها تا چه حد مطلوب است؟

واکسن های کووید-19 برای حفاظت در مقابل بیماری شدید، بستری شدن در بیمارستان، و مرگ ناشی از کووید-19، عملکردی بسیار مطلوب دارند. در مقایسه با افرادی که واکسن های کووید-19 آنان بروز است، افراد واکسینه نشده احتمال بیشتری برای ابتلا به کووید-19 دارند، احتمال بسیار بیشتری برای بستری شدن در بیمارستان به سبب کووید-19 دارند و احتمال بسیار بیشتری برای مرگ به سبب کووید-19 دارند.

کارشناسان مشاهده می کنند که حفاظت می تواند به مرور زمان ضعیف تر شود، به ویژه برای گروه های معینی از افراد مانند آنهایی که سنین 65 سال و بالاتر هستند و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند. دوزهای تقویتی کمک میکنند که این حفاظت باز گردد. به این دلیل، تقویتی برای تمامی افراد از سنین 12 سال و بالاتر و برای برخی از کودکان توصیه می شود. (دوزهای تقویتی) را برای اطلاعات بیشتر رؤیت کنید).

همچنان با تکامل دانش و ویروس، توصیه های واکسن نیز تکامل می یابند. دانشمندان و کارشناسان طبی به مشاهده نزدیک نشانه های کاهش مصونیت در افراد از سنین مختلف و با عوامل خطر متفاوت ادامه می دهند. آنها همچنین به چگونگی عملکرد مطلوب واکسن ها برای حفاظت در مقابل سویه های جدید ویروس می نگرند.

کدام واکسن ها در آمریکا در دسترس هستند؟

چهار واکسن کووید-19 برای پیشگیری از کووید-19 در آمریکا، تایید شده یا مجاز هستند. آنها ساخته فایزر (نام تجاری Comirnaty) Pfizer-BioNTech، مادرنا (نام تجاری Spikevax) Moderna، نووکس Novavax و جانسن و جانسن Johnson&Johnson هستند. واکسن های فایزر Pfizer و مادرنا Moderna برای افراد سنین 6 ماه و بزرگتر مجاز هستند. واکسن های نووکس Novavax برای افراد سنین 12 سال و بزرگتر مجاز هستند. واکسن های جانسن و جانسن Johnson&Johnson (J&J) برای بزرگسالان 18 سال و بالاتر مجاز هستند.

CDC (مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری) ارجحیت واکسن های کووید-19 فایزر Pfizer، مادرنا Moderna و نووکس Novavax را بر واکسن جانسن و جانسن J&J توصیه می کند. واکسن جانسن و جانسن J&J در برخی موقعیت ها می تواند مورد نظر قرار گیرد.

برای یادگیری بیشتر از تارنمای CDC واکسن های کووید-19 خود را بروز نگاه دارید دیدن کنید.



واکسن های کووید-19-سؤالات متداول اطلاعات اساسی واکسن

کجا می توانم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

- برای چاپ یا مشاهده این سؤالات متداول یا سؤالات متداول مربوط به مباحث دیگر واکسن کووید-19، کد QR را اسکن کنید یا [سؤالات متداول واکسن کووید-19](#) را دیدن نمایید.
- [VaccinateLACounty.com](#) – از جمله [زمان بندی های واکسن کووید-19](#) به همراه نگره های برای نشان دادن موعد تزریق هر دوز و اطلاعات مربوط به [چگونه واکسینه شویم](#).
- [تارنمای CDC](#) با عنوان [واکسن های کووید-19](#)
- اگر سؤالاتی دارید با پزشک خود صحبت کنید.

