



为什么给免疫系统薄弱者的疫苗接种建议不一样？

免疫系统中度或严重受损者（如患有与血液相关的癌症或正在接受特定的癌症治疗，接受了器官移植，患有某些自身免疫性疾病的个人）尤其容易受到 COVID-19 的侵害。他们比免疫系统正常者更容易感染 COVID-19。如果感染了 COVID-19，他们更有可能病得很重，并将病毒传播给其他人。

此外，一些免疫系统薄弱的个人在接种标准的 COVID-19 初始系列疫苗剂量后，不会产生足够的保护力。

正因如此，给免疫系统中度或严重削弱的人的疫苗接种建议不同，以帮助增强他们获得的保护。此外，还建议许多免疫功能中度或严重受损的人使用一种可以帮助预防 COVID-19 感染的药物：[Evusheld](#)（详见下文）。

我应该接种多少剂疫苗？

这取决于你的年龄和你接种的初始系列疫苗。

初始系列疫苗

- 如果你接种的初始系列疫苗是辉瑞(Pfizer)或莫德纳(Moderna)疫苗，你应该接种三剂。
- 如果你接种的初始系列疫苗是从强生(J&J)疫苗开始的，你应该接种一剂强生疫苗再加一剂辉瑞或莫德纳疫苗。
- 如果你接种的初始系列疫苗是诺瓦瓦克斯(Novavax)疫苗，你应该接种两剂。

加强剂疫苗

- **5岁及以上的人** – 你应该在接种完上一剂 COVID-19 疫苗（初始系列疫苗的最后一剂或上一剂加强剂）的至少两个月后接种一剂秋季（更新版）二价加强剂*，无论你过去接种了多少剂加强剂或接种了哪种疫苗。
 - 6岁及以上的人可接种辉瑞或莫德纳秋季加强剂。
 - 5岁的儿童只能接种辉瑞的秋季加强剂。

*如果你年满 18 岁，且满足以下所有条件，就可以选择接种一剂诺瓦瓦克斯（单价）疫苗作为加强剂，而不是一剂 mRNA（辉瑞或莫德纳）二价加强剂：你不能或不愿接种 mRNA 加强剂，并且你已经完成了初始系列疫苗的接种，并且你之前从未接种过任何 COVID-19 加强剂疫苗。

- **6个月至4岁儿童**——目前没有获得授权可供这个年龄段接种的加强剂。

请访问美国疾病控制与预防中心(CDC)的“[保持最新的 COVID-19 疫苗接种状态（包括加强剂）](#)”网页，使用上面的“了解何时接种加强剂”工具，了解你（或你的孩子）何时应该接种 COVID-19 疫苗。

向你的医生询问根据你目前的治疗计划，接种疫苗剂量的最佳时机。如果你即将开始或重新开始





COVID-19 疫苗 – 常见问题解答 (FAQ)

适用于免疫功能受损者

免疫抑制治疗，这一点尤为重要。

请参阅公共卫生局网页 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules 上的 [COVID-19 疫苗接种时间表](#)，了解所有建议免疫功能受损者接种的初始和加强剂量疫苗。

我还应该采取哪些措施来保护自己？

除了接种 COVID-19 疫苗外，采取其他措施保护自己免于感染 COVID-19 也很重要：

- **咨询你的医生，了解有关预防 COVID-19 的药物。** 目前，一种名为 Evusheld 的药物可用于让仅靠接种疫苗无法建立足够保护力的个人预防 COVID-19 感染。给药方式是一次进行两针臀部注射。年满 12 岁且体重至少为 88 磅的个人每六个月注射一次。有关更多信息，请参阅美国食品药品监督管理局 (FDA) 提供给患者/父母的 [Evusheld 资料便览](#)。
- **佩戴具有防护性的口罩**，例如贴合面部的呼吸器（如 N95、KN95、KF94）或佩戴 [双层口罩](#)，以加强防护效果。尽量避免前往人群拥挤的室内区域或空气流通不畅的地点。欲了解更多详情，请参阅 ph.lacounty.gov/reducerisk 和 ph.lacounty.gov/masks。
- **鼓励和你在一起的人帮助保护你的健康。** 他们应该 [保持最新的](#) COVID-19 疫苗接种状态，包括接种他们的秋季加强剂（如果年满 5 岁），并采取其他措施减少他们感染和传播 COVID-19 给你的 [风险](#)。

我在哪里可以获得更多的信息？



- 如需打印或查看本常见问题解答或其他关于 COVID-19 疫苗主题的常见问题解答，请扫描二维码或访问 [COVID-19 疫苗常见问题解答 \(FAQ\)](#)。
- VaccinateLACounty.com – 包括 [COVID-19 疫苗接种时间表](#)，其中有图表显示应接种每一剂疫苗的时间，以及 [如何接种疫苗](#) 的信息。
- 欲了解更多信息，请参阅美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的网页：“[适用于中度或重度免疫功能受损者的 COVID-19 疫苗](#)”。
- 如果你有任何问题，请咨询你的医生。

