



為什麼給免疫系統薄弱者的疫苗接種建議不一樣？

免疫系統中度或嚴重受損者（如患有與血液相關的癌症或正在接受特定的癌症治療，接受了器官移植，患有某些自身免疫性疾病的個人）尤其容易受到COVID-19的侵害。他們比免疫系統正常者更容易感染COVID-19。如果感染了COVID-19，他們更有可能病得很重，並將病毒傳播給其他人。

此外，一些免疫系統薄弱的個人在接種標準的COVID-19初始系列疫苗劑量后，不會產生足夠的保護力。

正因如此，給免疫系統中度或嚴重削弱的人的疫苗接種建議不同，以幫助增強他們獲得的保護。此外，還建議許多免疫功能中度或嚴重受損的人使用一種可以幫助預防COVID-19感染的藥物：[Evusheld](#)（詳見下文）。

我應該接種多少劑疫苗？

這取決於你的年齡和你接種的初始系列疫苗。

初始系列疫苗

- 如果你接種的初始系列疫苗是輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，你應該接種三劑。
- 如果你接種的初始系列疫苗是從強生(J&J)疫苗開始的，你應該接種一劑強生疫苗再加一劑輝瑞或莫德納疫苗。
- 如果你接種的初始系列疫苗是諾瓦瓦克斯(Novavax)疫苗，你應該接種兩劑。

加強劑疫苗

- **5歲及以上的人** – 你應該在接種完上一劑COVID-19疫苗（初始系列疫苗的最後一劑或上一劑加強劑）的至少兩個月後接種一劑秋季（更新版）二價加強劑*，無論你過去接種了多少劑加強劑或接種了哪種疫苗。
 - 6歲及以上的人可接種輝瑞或莫德納秋季加強劑。
 - 5歲的兒童只能接種輝瑞的秋季加強劑。

*如果你年滿 18 歲，且滿足以下所有條件，就可以選擇接種一劑諾瓦瓦克斯（單價）疫苗作為加強劑，而不是一劑 mRNA（輝瑞或莫德納）二價加強劑：你不能或不願接種 mRNA 加強劑，**並且**你已經完成了初始系列疫苗的接種，**並且**你之前從未接種過任何 COVID-19 加強劑疫苗。
- **6個月至4歲兒童**——目前沒有獲得授權可供這個年齡段接種的加強劑。

請訪問美國疾病控制與預防中心(CDC)的「[保持最新的COVID-19疫苗接種狀態（包括加強劑）](#)」網頁，使用上面的「瞭解何時接種加強劑」工具，瞭解你（或你的孩子）何時應該接種COVID-19疫苗。

向你的醫生詢問根據你目前的治療計劃，接種疫苗劑量的最佳時機。如果你即將開始或重新開始



COVID-19 疫苗 – 常見問題解答 (FAQ)

適用於免疫功能受損者

免疫抑制治療，這一點尤為重要。

請參閱公共衛生局網頁 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules 上的 [COVID-19疫苗接種時間表](#)，瞭解所有建議免疫功能受損者接種的初始和加強劑量疫苗。

我還應該採取哪些措施來保護自己？

除了接種COVID-19疫苗外，採取其他措施保護自己免於感染COVID-19也很重要：

- 諮詢你的醫生，瞭解有關預防COVID-19的藥物。目前，一種名為Evusheld的藥物可用於讓僅靠接種疫苗無法建立足夠保護力的個人預防COVID-19感染。給藥方式是一次進行兩針臀部注射。年滿12歲且體重至少為88磅的個人每六個月注射一次。有關更多資訊，請參閱美國食品藥物管理局 (FDA) 提供給患者/父母的 [Evusheld資料便覽](#)。
- 佩戴具有防護性的口罩，例如貼合面部的呼吸器（如N95、KN95、KF94）或佩戴 [雙層口罩](#)，以加強防護效果。盡量避免前往人群擁擠的室內區域或空氣流通不暢的地點。欲瞭解更多詳情，請參閱 ph.lacounty.gov/reducerisk 和 ph.lacounty.gov/masks。
- 鼓勵和你在一起的人幫助保護你的健康。他們應該 [保持最新的](#) COVID-19疫苗接種狀態，包括接種他們的秋季加強劑（如果年滿5歲），並採取其他措施減少他們感染和傳播COVID-19給你的 [風險](#)。

我在哪裡可以獲得更多的資訊？



- 如需列印或查看本常見問題解答或其他關於COVID-19疫苗主題的常見問題解答，請掃描QR碼或訪問 [COVID-19 疫苗常見問題解答 \(FAQ\)](#)。
- VaccinateLACounty.com – 包括 [COVID-19疫苗接種時間表](#)，其中有圖表顯示應接種每一劑疫苗的時間，以及 [如何接種疫苗](#) 的資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請參閱美國疾病控制與預防中心(CDC)的網頁：「[適用於中度或重度免疫功能受損者的 COVID-19 疫苗](#)」。
- 如果你有任何問題，請諮詢你的醫生。

