

원숭이두창 감염 증상 알아보기

주요 증상

발진



발진 증상은:

- 혹, 여드름, 물집, 상처, 가피(딱지)처럼 보입니다.
- 생식기, 항문, 입안, 손, 얼굴 등 신체 어느 부위든 나타날 수 있습니다.
- 한 부위에만 국한되거나 전신에 퍼질 수 있습니다.
- 가렵거나 통증성 발진 (특히 구강 또는 항문 안)

기타 증상

독감과 유사한 증상



발열/오한



탈진, 근육통과 두통



림프절 종창 (부어오름)

- 발진이 나타나기 시작하고 1~4일 전후로 독감과 유사한 증상이 나타날 수 있습니다
- 모든 사람이 이러한 증상을 겪는 것은 아닙니다

증상은 노출된 후에 보통 **5-21일** 사이에 나타납니다.

발진은 여러 형태 (아래 참조)로 나타날 수 있습니다. 참고: 발진 증상은 다음의 예시와 다르게 나타날 수 있습니다.



새롭게 출현하거나 설명할 수 없는 발진 또는 신체의 어느 부위에든 병변이 생기는 경우 **담당 의사에게 즉시 연락하십시오.** 이것은 원숭이두창 감염자나 감염 의심자에게 노출된 경우 특히 중요합니다.

원숭이두창 증상이 회복돼 감염력이 없어질 때까지 노출된 발진을 가리거나 타인과 거리 두기를 포함하여 감염의 위험을 줄 수 있는 조치를 취하십시오. 아래 웹사이트 ph.lacounty.gov/monkeypoxisolation를 참조하십시오.

담당 의사가 없는 경우:

- 공중 보건 콜 센터 1-833-540-0473 (주 7일 오전 8시~오후 8시 30분 운영)로 연락하거나
- 가까운 [공중 보건 성 건강 클리닉](#)을 방문하십시오.

원숭이두창에 대한 더 자세한 정보는 아래 웹사이트를 방문하십시오:

ph.lacounty.gov/Monkeypox

Know the Signs of Monkeypox 8/31/2022 (Korean)

QR코드를 스캔하여 클리닉 찾기



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health